

INSTRUCCIONES DE SIGMOIDOSCOPIA FLEXIBLE

Fecha de Procedimiento: _____

Cita de Seguimiento: _____

El centro de cirugía le llamara **2 días de negocio** antes de su procedimiento con su hora de llegada.

- Cypress Ambulatory Surgery Center
5016 W. Cypress Street
Suite 100
Tampa, FL 33607
(813)542-2589
- St. Joseph's Same Day Surgery Center
3001 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. Tampa, FL 33607
Phone: 813-870-4711

Instrucciones:

- Cinco días antes no tome Aspirina, Advil, Aleve, Motrin, Naprosyn, Celebrex, Trental, Relafen, todas vitaminas, y suplementos herbales. Es seguro tomar Tylenol como un alivio al dolor.
- Deje de tomar Coumadin y Plavix cinco días antes de su procedimiento. Continúa tomando medicamentos de rutina, incluyendo medicamentos para la presión arterial y corazón.
- Si es diabético/a, no tome medicamentos diabéticos la noche antes o la mañana del procedimiento.
- Nada de tomar o comer después de la media noche el día antes del procedimiento. Usted puede tomar medicamentos necesarios con un sorbo de agua hasta tres horas antes del procedimiento.

Día antes de procedimiento:

- Dieta de líquidos claros
- A las 6 PM dos botellas de citrato de magnesio
- La mañana del procedimiento hacer 1 enema Fleet
- Usted necesita tener un amigo o familiar que lo lleve y recoja de la facilidad.
NO SE PERMITE CUAL QUIERE USO DE SERVICIO DE TAXI

Por favor permita 5 días de negocio para notificar cancelación del procedimiento o vera un cargo de \$200.

Por favor llame la oficina si usted tiene cual quiere pregunta o preocupación.

Visita nos en www.Gastro-MD.com

