

## PREPARACIÓN DE INTESTIM

Fecha de Procedimiento: \_\_\_\_\_

Seguimiento: \_\_\_\_\_

El centro de cirugía le llamara con su hora de llegada **2 días de negocio** antes de la fecha de su procedimiento.

- Cypress Ambulatory Surgery Center
- St. Joseph's Same Day Surgery Center

### ¿Qué es InterStim?

Una terapia de control intestinal medtronic enviada por el sistema InterStim para controlar los síntomas de FI por estimulando suavemente el nervio sacro. Con esta terapia usted puede sentir menos episodios, menos accidentes, y más confianza regresando a las actividades que usted disfruta.

### Preparación:

- No comidas solidadas después de la media noche
- Líquidos claros hasta 3 horas antes de su hora de llegada. (Incluye goma y mentas)
- 5 días antes del procedimiento: **NO TOME** pastillas de hierro o medicamentos que puedan causar sangramiento. Estos medicamentos incluyen Plavix, Coumadin, y Aspirina. Usted debe **PARAR** cualquier tipo de drogas anti inflamatoria incluyendo: Aspirina, Ibuprofeno, Motrin, Advil, Naprosyn, Naproxeno, y Diclofenaco.
- Vístase cómodamente
- Usted necesita tener un amigo o familiar que lo lleve y recoja de la facilidad.  
**NO SE PERMITE CUAL QUIERE USO DE SERVICIO DE TAXI**

**Por favor permita 5 días de negocio para notificar cancelación del procedimiento o vera un cargo de \$200.**

