

Instrucciones de colonoscopia (CLENPIQ)

Fecha del procedimiento: _____ Seguir: _____

El centro de cirugía llamará con el tiempo 2 días antes de la fecha de su procedimiento

- Cypress Ambulatory Surgery Center
5016 W. Cypress Street, Suite 100 Tampa, FL 33607
Teléfono: 813-542-2589
- St. Joseph's Same Day Surgery Center
3001 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. Tampa, FL 33607
Phone: 813-870-4711

INSTRUCCIONES:

- Continuar tomando medicamentos de rutina, incluida la presión arterial y medicamentos para el corazón.
- Si es diabético, solo tome la mitad de su dosis habitual la mañana del procedimiento.
- Antes de suspender cualquier diluyente de sangre, hable con su proveedor de recetas.
- Mantenga Coumadin, Plavix, Effient, Brilinta durante 5 días antes del procedimiento.
- Mantenga Pradaxa, Eliquis y Xarelto durante 2 días antes del procedimiento.
- 5 días antes, descontinúe los suplementos de hierro, las vitaminas o los suplementos de hierbas
- 5 días antes, no tome ninguno: Aleve, Motrin, Naproxen, Ibuprofen - Tylenol es seguro de usar
- Debe tener un miembro familiar o amigo conducir a y desde la instalación. **NO SE PERMITE NINGÚN TIPO DE SERVICIO DE TAXI.**

DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

¡No coma ningún alimento sólido todo el día antes del procedimiento!

Ten una dieta líquida clara durante todo el día. Evite los líquidos que son de color rojo o morado, como la uva roja o el jugo de arándano. Evite TODOS los productos lácteos y jugos con pulpa, como el jugo de naranja o pomelo. Puede beber líquidos claros (SIN COLORES ROJOS / OSCUROS) hasta 3 horas antes del procedimiento. En la marca de 3 horas, nada por la boca incluyendo agua. Puede tomar cualquier medicamento necesario con un pequeño sorbo de agua.

Los líquidos claros incluyen lo siguiente:

Sopas: caldo (pollo, carne de res o vegetal)

Zumos: jugo de uva blanca, manzana, etc.

Postres: gelatina, hielo italiano, paletas heladas, etc.

Bebidas deportivas: Powerade, Gatorade, Propel

Bebidas: té, Kool-aid, agua, café negro

Si tu procedimiento es antes de las 12PM	Si tu procedimiento es despues de las 12PM
1. A las 5:00PM, tome una botella de 5.4 onzas de CLENPIQ.	1. A las 7:00PM, tome una botella de 5.4 onzas de CLENPIQ.
2. Tomar (2) de mas de 16 onzas de agua fria o Liquido Claro en la proxima hora.	2. Tomar 2 de mas de 16 onzas de agua fria o Liquido Claro en la proxima hora.
3. A las 11:00PM, tome una botella de 5.4 onzas de CLENPIQ.	3. A las 6:00PM, tome una botella de 5.4 onzas de CLENPIQ.
4. Tomar (2) de mas de 16 onzas de agua fria o Liquido Claro en la proxima hora.	4. Tomar (2) de mas de 16 onzas de agua fria o Liquido Claro en la proxima hora.

Por favor permita un aviso de 5 días hábiles para la cancelación o habrá un cargo de \$ 200.