

INSTRUCCIONES DE COLONOSCOPIA (PLENVU)

Fecha de Procedimiento: _____ Cita de Seguimiento: _____

*El centro de cirugía le llamara **2 días de negocio** antes de su procedimiento con su hora de llegada.*

- Cypress Ambulatory Surgery Center
5016 W. Cypress Street, Suite 100 Tampa, FL 33607

Teléfono: 813-542-2589
- St. Joseph's Same Day Surgery Center
3001 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. Tampa, FL 33607

Teléfono: 813-870-4711

Instrucciones:

- Continúa tomando medicamentos de rutina, incluyendo medicamentos para la presión arterial y corazón.
- Si es diabético, solo tome ½ de su dosis usual la mañana del procedimiento.
- Antes de dejar de tomar cual quiere anticoagulante, por favor hable con el proveedor que receta
- Sostener los siguientes medicamentos Coumadin, Plavix, Effient, Brilinta 5 días antes del procedimiento.
- Sostener los siguientes medicamentos Pradaxa, Eliquis, y Xarelto 2 días antes del procedimiento
- **5 días** antes, discontinuar suplementos de hierro, vitaminas, o suplementos herbales
- **5 días** antes, no tomar: Aleve, Motrin, Naproxeno, Ibuprofeno- Tylenol si es seguro para usar.
- **Usted necesita tener un amigo o familiar que lo lleve y recoja de la facilidad.**
NO SE PERMITE CUAL QUIERE USO DE SERVICIO DE TAXI

NO coma ningún alimento sólido durante todo el día antes del procedimiento.

Sega una dieta de líquidos claros durante el día. Evité líquidos que sean rojos o morados en color, como jugo de uva o arándano, Evité TODOS productos lácticos y jugos con pulpa como jugo de naranja o toronja. usted puede beber líquidos claros (**NADA ROJO/COLORES OSCUROS**) con tal que será 3 horas antes del procedimiento. Usted puede tomar medicamentos necesarios con un sorbo de agua con tal que será tres horas antes del procedimiento. No debe beber nada después de las 3 horas por boca, esto incluye agua.

Líquidos claros incluyen los siguientes:

Sopas: caldo colado (pollo, res, o vegetal)

Jugos: Jugo de uvas blancas, manzana etc.

Postres: Jello, Hielo Italiano, Paletas de hielo (No rojo), etc.

Bebidas deportivas: Powerade, Gatorade, Propel (Nada Rojo)

Bebidas: Té, Kool-Aid (No rojo), agua, café negro

Si su procedimiento es antes de 12PM	Si su procedimiento es después de 12PM
1. A las 5:00 PM, vierta (1) bolsa de Plenvu en el recipiente de mezcla. Agregue agua fría hasta la línea de 16 onzas y beba todo el líquido en la taza.	1. A las 7:00 PM, vierta (1) bolsa de Plenvu en el recipiente de mezcla. Agregue agua fría hasta la línea de 16 onzas y beba todo el líquido en la taza.
2. Beba (1) taza más de 16 onzas de agua (o líquido transparente) durante la próxima 1 hora.	2. Beba (1) taza más de 16 onzas de agua (o líquido transparente) durante la próxima 1 hora.
3. A las 11:00 PM., Vierta (1) bolsa de Plenvu en el recipiente de mezcla. Agregue agua fría hasta la línea de 16 onzas y beba todo el líquido en la taza.	3. A las 6:00 am, vierta (1) bolsa de Plenvu en el recipiente de mezcla. Agregue agua fría hasta la línea de 16 onzas y beba todo el líquido en la taza.
4. Beba (1) taza más de 16 onzas de agua (o líquido transparente) durante la próxima 1 hora.	4. Beba (1) taza más de 16 onzas de agua (o líquido transparente) durante la próxima 1 hora.

Por favor permita 5 días de negocio para notificar cancelación del procedimiento o vera un cargo de \$200.